PuraDES

# FOOD & GASTRO
# GEBÄUDEREINIGUNG
# INDUSTRIE
# KOMMUNEN
# RETAIL & WEITERE

PuraDES – HYGIENE PUR

Kompakte Produktserie

Passend für alle wichtigen
Einsatzbereiche und
Anwendungszwecke

Moderne und
innovative Rezepturen

Sichere und
zuverlässige Qualität

Maximale mikrobiologische
Leistungsfähigkeit bei minimaler
Chemikalien-Belastung

# PuraDES – HYGIENE PUR

## PuraDES umfasst ein kompaktes Vollsortiment mit Produkten für die Hände-, Flächen-, sowie Instrumenten- und Wäsche-Desinfektion.

Wir haben bei der Entwicklung der PuraDES-Produktserie großen Wert darauf gelegt, dass unsere Desinfektionsmittel weder sensibilisierend wirken noch gefährlich im Umgang oder in der Anwendung sind. So verzichten wir beispielsweise auf toxische Aldehyde oder andere aggressive Inhaltsstoffe. Außerdem sind die PuraDES-Produkte überwiegend parfüm- und farbstofffrei und damit auch für Allergiker gut geeignet (hypoallergen).

**PuraDES – HYGIENE PUR.**



# INHALT


## 07 HÄNDE

08 TetraMAN B
10 PentaMAN B
12 TetraMAN GEL
14 TetraMAN WASH
16 TetraMAN SOAP

## 19 DESINFEKTIONSTÜCHER

20 DecaWIPES BOX
22 DecaWIPES BOX N
24 DecaWIPES L
26 DecaWIPES XL
28 DecaWIPES XL N
30 DecaWIPES XXL
32 DecaWIPES DRY
34 DecaWIPES FLOW
36 DecaWIPES FLOW N
38 DecaWIPES FLOW N PLUS

## 41 FLÄCHEN

42 TetraCID KONZ
44 PentaCID KONZ
46 DecaBAC S / DecaBAC A
48 DecaBAC N / DecaBAC F

## 50 INSTRUMENTE

52 HeptaPURE KONZ

## 54 ZUBEHÖR

54 Wandspender Vario TOUCHLESS
56 Zubehörübersicht

## 60 PRODUKT-ÜBERSICHT

## 68 PFLICHTTEXT-ANGABEN

# INSTRUMENTE

Im Eis der Antarktis haben Wissenschaftler Mikroben gefunden, die 32.000 Jahre lang eingefroren waren. Als man die Bakterien auftaute, kehrten sie zurück ins Leben und begannen, sich zu vermehren.

Mit Krankheitserregern kontaminierte Instrumente können die Quelle von Infektionen beim Menschen sein. Die Anwendung von Instrumenten setzt daher eine vorhergehende Aufbereitung voraus. Die PuraDES Instrumentendesinfektions-Konzentrate zeichnen sich trotz schonender und milder Formulierung durch eine hohe Reinigungskraft, zuverlässige Wirksamkeit und ausgezeichnete Materialverträglichkeit aus.

VAH

IHO

# HeptaPURE KONZ (bisher: PentaSEPT KONZ)

## Instrumentendesinfektion Konzentrat

### Vorteile

- **Viruzid (inkl. Noro, Adeno, Polio)**
- **Bakterizid, Levurozid, Tuberkulozid, Fungizid**
- **Aldehydfrei**
- **Sehr gute Reinigungsleistung**
- **keine Fixierung von Eiweißen**
- **Ausgezeichnete Materialverträglichkeit**
- **Nicht korrosiv, greift Oberflächen der Instrumente nicht an**

### Anwendungsgebiete

- Für die klassische manuelle Aufbereitung von Instrumenten in allen Bereichen (auch für Kosmetik-, Fußpflege, Piercing- oder Tätowierstudios).

HeptaPURE KONZ ist ein flüssiges Konzentrat zur regelmäßigen manuellen Reinigung und abschließenden Desinfektion von invasiven und nichtinvasiven Instrumenten im Tauchbadverfahren. Bei geringer Anwendungskonzentration wird ein umfassendes Wirkspektrum gegen Bakterien, Hefen, Pilzen und Viren abgedeckt. Der milde Geruch ermöglicht eine anwenderfreundliche Instrumentenaufbereitung. Die praktische Dosierflasche erlaubt eine einfache Abmessung des Konzentrats und verhindert Dosierfehler.

### Zusammensetzung

8,0g Didecyldimethylammoniumchlorid

5,0g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin

| Wirksamkeiten und Prüfmethoden | | Belastung | 15 Min. | 60 Min. |
|---|---|---|---|---|
| **Bakterien und Pilze** | | | | |
| Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (bakterizid, levurozid)* | VAH | hohe Belastung | 2 % | 1 % |
| tuberkulozid (*M. terrae*) | EN 14348/ EN 14563 | niedrige Belastung | 2 % | 1 % |
| fungizid *(A. brasiliensis)* | EN 13624/EN14562 | niedrige Belastung | | 5 % |
| **behüllte Viren** | | | | |
| wirksam gegen alle behüllten Viren** | RKI/DVV | | 2 % | 1 % |
| **unbehüllte Viren** | | | | |
| wirksam gegen alle behüllten und unbehüllten Viren (viruzid), z.B. Adeno, Noro, Polio | EN 14476 | niedrige Belastung | | 5 % |
| wirksam gegen Noro-Viren (MNV) | EN 14476 | hohe Belastung | 3 % | |
| wirksam gegen Rota-Viren | EN 14476 | niedrige Belastung | 3 % | |
| wirksam gegen Adeno-Viren | EN 14476 | niedrige Belastung | 3 % | |
| wirksam gegen Polyoma-Viren (SV 40) | RKI/DVV | | | 5 % |

* einschließlich Phase 2/Stufe 1 - und Phase 2/ Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Versuche)

** gemäß RKI/DVV Prüfviren BVDV und Vaccinia Virus Stamm Elstree, erlaubt den Rückschluss auf alle anderen behüllten Viren inkl HIV, HBV, HCV

### Erhältlich als

| Gebinde | Inhalt | Art.Nr. | IGEFA Art. Nr. | Stück pro Karton |
|---|---|---|---|---|
| Dosierflasche | 1.000 ml | Pura540 | 2157800 | 9 |
| Kanister | 5 l | Pura541 | 2157801 | |
| Kanister | 10 l | Pura542 | 2157802 | |

# Die PuraDES-Produktwelt

- MEDICAL
- FOOD & GASTRO

  GEBÄUDEREINIGUNG

  INDUSTRIE

  KOMMUNEN

  RETAIL & WEITERE

- DecaWIPES BOX
- DecaWIPES BOX N
- DecaWIPES L
- DecaWIPES XL
- DecaWIPES XL N
- DecaWIPES XXL
- DecaWIPES DRY
- DecaWIPES FLOW
- DecaWIPES FLOW N
- DecaWIPES FLOW N PLUS
- TetraCID KONZ
- PentaCID KONZ
- HeptaCID KONZ
- DecaBAC S / DecaBAC A
- DecaBAC N / DecaBAC F

- TetraMAN B
- PentaMAN B
- TetraMAN GEL
- TetraMAN WASH
- TetraMAN SOAP




| Produkt | Klassifizierung | | Desinfektionswirkstoff | | | | | Wirksamkeit | | | | | | Eigenschaften | | | | Wirkungsbereiche | | | | | | | | | | | | | | Einsatzbereiche | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Biozid | AMG | Alkohol - Ethanol | Alkohol - 1-Propanol | Alkohol - 2-Propanol | QAV | CHX | begrenzt viruzid | begrenzt viruzid PLUS | viruzid | Händedesinfektionsgel | Händereinigung | Hautdesinfektion | farbstofffrei | parfümfrei | rückfettend | Listung | Hygienische Händedesinfektion gem.VAH + EN 1500 (Bacteria/Candida) | Chirurgische Händedesinfektion gem. VAH + EN 12791 (Bacteria/Candida) | Hygienische Händewaschung gem. EN 1499 inkl. EN 13727, EN 13624 | TbB gem. EN 14348 | Viren | | | | | | | | Mycobact. EN14348 | MRSA | Gesundheitswesen | Food & Gastro | Gebäudereinigung | Industrie | Kommunen |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | behüllte Viren “begrenzt viruzid” | Rota | Adeno | Noro | Polyoma SV40 | Polio | “viruzid EN 14476” | “viruzid RKI / DVV” | M. avium | | | | | | |
| TetraMAN | | • | | | • | | | • | | | | | • | • | • | | VAH/IHO | 30sec. | 1min. | | 30sec. | 15sec. | | | 30sec. | | | | | | 15sec. | • | | | | |
| TetraMAN B | • | | • | • | | | | • | • | | | | • | • | • | • | VAH/IHO | 30sec. | | | 30sec. | 30sec. | | 60sec. | 1min. | | | | | 30sec. | 30sec. | • | • | • | • | • |
| PentraMAN | | • | • | • | | | | | | • | | | | • | • | • | VAH/RKI (A)/IHO | 30sec. | 1,5min. | | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 60sec. | 30sec. | 60sec. | 1min. | 1min. | 1min. | | 30sec. | • | | | | |
| PentaMAN B | • | | • | • | | | | | | • | | | • | • | • | • | | 30sec. | | | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 60sec. | 1min. | 1min. | 1min. | | 30sec. | • | • | • | • | • |
| TetraMAN GEL | • | | • | • | | | | • | • | | • | | | • | • | • | VAH/IHO | 30sec. | | | 30sec. | 30sec. | | | 1min. | | | | | 30sec. | 30sec. | • | • | • | • | • |
| TetraMAN WASH | • | | | | | • | • | | | | | • | | • | • | • | VAH | | | 30sec. | | | | | | | | | | | 30sec. | • | • | • | • | • |

| Produkt | Klassifizierung | | Desinfektionswirkstoff | | | Anwendungsgebiete | | | | Eigenschaften | | | | | | | | | | | Wirksamkeit | | | | | | Wirkungsbereiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Anwendung | Einsatzbereiche | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Biozid | Medizinprodukt | Alkohol | QAV | Amine | Flächendesinfektion / Wischdesinfektion | Schnelldesinfektion | Flächenreinigung | große Flächen | gebrauchsfertig | Konzentrat | alkoholisch | alkoholfrei | aldehydfrei | QAV-frei | farbstofffrei | Aerosol | Blattanzahl | Größe (in cm) | Listung | bakterizid | Levurozid | tuberkulozid | begrenzt viruzid | begrenzt viruzid PLUS | viruzid | *Bacteria / Candida albicans* gem. VAH | | | | | Flächentest | *C. albicans* gem. EN | | | Bacteria gem. EN | | | TbB (*M. terrae*) gem. EN, VAH/DGHM | | | | | | Viren | | | | | | | | pH-Wert der gebrauchsfertigen Lösung | Gesundheitswesen | Food & Gastro | Gebäudereinigung | Industrie | Kommunen |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1min. | 2min. | 15min. | 30min. | 240min. | EN 16615 | EN 1650 | EN 13697 | EN 13624 | EN 1276 | EN 13697 | EN 13727 | 30sec. | 1min. | 5min. | 15min. | 30min. | 60min. | behüllte Viren „begrenzt viruzid” | Rota | Adeno | Noro | Polyoma SV40 | Polio | begrenzt viruzid PLUS | viruzid (EN 14476) | | | | | | |
| DecaWIPES BOX | • | IIb | • | | | • | • | • | | • | | • | | • | • | | | 100 | 12x20 | VAH /IHO | • | • | • | • | • | | | • | | | | 2min. | 1min. | | 30sec. | 1min. | | 30sec. | • | • | | | | | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 1min. | | | 1min. | | | • | • | • | • | • |
| DecaWIPES BOX N | • | IIa | | • | | • | • | • | | • | | | • | • | | | | 100 | 12x20 | VAH /IHO | • | • | | • | | | • | | | | | 2min. | 1min. | 1min. | 1min. | 1min. | 1min. | 1min. | | | | | | | 1min. | 1min. | | 30min. | | | | | 100% / 8,0 | • | | • | • | • |
| DecaWIPES L | • | IIb | • | | | • | • | • | | • | | • | | • | • | | | 240 | 15x23 | VAH /IHO | • | • | • | • | • | | • | | | | | 1min. | 1min. | | 1min. | 1min. | | 1min. | • | • | | | | | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 1min. | | | 1min. | | | • | • | • | • | • |
| DecaWIPES XL | • | IIb | • | | | • | • | • | | • | | • | | • | • | | | 150 | 20x30 | VAH /IHO | • | • | • | • | • | | • | | | | | 1min. | 1min. | | 1min. | 1min. | | 1min. | • | • | | | | | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 1min. | | | 1min. | | | • | • | • | • | • |
| DecaWIPES XL N | • | IIa | | • | | • | • | • | | • | | | • | • | | | | 150 | 20x30 | VAH /IHO | • | • | | • | | | | • | | | | 2min. | 1min. | 1min. | 1min. | 1min. | 1min. | 1min. | | | | | | | 1min. | 1min. | | 30min. | | | | | 100% / 8,0 | • | | • | • | • |
| DecaWIPES XXL | • | IIb | • | | | • | • | • | | • | | • | | • | • | | | 75 | 28x28 | VAH /IHO | • | • | • | • | • | | • | | | | | 1min. | 1min. | | 1min. | 1min. | | 1min. | • | • | | | | | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 1min. | | | 1min. | | | • | • | • | • | • |
| DecaWIPES FLOW | • | IIb | • | | | • | • | • | | • | | • | | • | • | | | 80 | 20x30 | VAH /IHO | • | • | • | • | • | | • | | | | | 2min. | 1min. | | 1min. | 1min. | | 1min. | • | • | | | | | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 1min. | | | 1min. | | | • | • | • | • | • |
| DecaWIPES FLOW N | • | IIa | | • | | • | • | • | | • | | | • | • | | | | 80 | 20x30 | VAH /IHO | • | • | | • | | | | • | | | | 2min. | 1min. | 1min. | 1min. | 1min. | 1min. | 1min. | | | | | | | 1min. | 1min. | 30min. | 30min. | | | | | 100% / 8,0 | • | | • | • | • |
| DecaWIPES FLOW N PLUS | • | IIb | | • | • | • | • | | | • | | | • | • | | | | 80 | 20x30 | VAH/IHO | • | • | • | • | • | • | | • | | | | 2min. | | | | | | | | | • | | | | 2min. | 2min. | 2min. | 2min. | | | 2min. | 2min. | | • | | • | • | • |
| TetraCID KONZ | • | | | | • | • | | • | • | | • | | • | • | • | • | | | | VAH /IHO | • | • | • | • | | | | | 1,0% | 0,5% | 0,25% | | 0,5% 15min. | 1,0% 5min. | 1,0% 5min. | 1,0% 5min. | 1,0% 5min. 0,5% 15min. | 1,0% 5min. | | | | | | 1,50% | 2,0% 15min. 1,5% 30min. | | | | | | | | 1,0% / 9,8 | • | • | • | • | • |
| PentaCID KONZ | • | IIb | | • | • | • | | • | • | | • | | • | • | | • | | | | VAH /IHO | • | • | • | • | | | | | 0,5% | | | 0,5% 15min. | | 0,5% 15min. | 0,5% 15min. | | 0,5% 15min. | 0,5% 15min. | | | | 2,00% | | 0,50% | 0,5% 15min. | 0,5% 15min. | | 1,5% 15min. 1,0% 60min. | 1,0% 15min. | | | | 0,5% / 9,2 | • | | • | • | • |
| HeptaCID KONZ | • | IIb | | • | • | • | | • | • | | • | | • | • | | • | | | | VAH /IHO | • | • | • | • | • | • | | | 0,5% | | | 0,5% 15min. | | 0,5% 15min. | 1,0% 1min. 0,5% 15min. | | 0,5% 15min. | 1,0% 1min. 0,5% 15min. | | | | 1,00% | 0,50% | | 0,5% 15min. | 0,5% 15min. | 3% 15min. 2% 30min. | 0,5% 15min. | 1,0% 15min. | 3,0% 30min. | | 3,0% 30min. | 0,5% / 9,8 | • | | | | |
| DecaBAC S | • | IIb | • | | | • | • | • | | • | | • | | • | • | | | | | VAH /IHO | • | • | • | • | • | | • | | | | | 1min. | 1min. | | 1min. | 1min. | | 1min. | • | • | | | | | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 1min. | | | 1min. | | | • | • | • | • | • |
| DecaBAC A | • | IIb | • | | | • | • | • | | • | | • | | • | • | | • | | | VAH /IHO | • | • | • | • | • | | • | | | | | 1min. | 1min. | | 1min. | 1min. | | 1min. | • | • | | | | | 30sec. | 30sec. | 30sec. | 1min. | | | 1min. | | | • | • | • | • | • |
| DecaBAC N | • | IIa | | • | | • | • | • | | • | | | • | • | | | | | | VAH /IHO | • | • | | • | | | | • | | | | 2min. | 1min. | 1min. | 1min. | 1min. | 1min. | 1min. | | | | | | | 1min. | 1min. | | 30min. | | | | | 100% / 8,0 | • | • | • | • | • |
| DecaBAC F | • | IIa | | • | | • | • | • | | • | | | • | • | | | • | | | VAH /IHO | • | • | | • | | | | • | | | | 2min. | 1min. | 1min. | 1min. | 1min. | 1min. | 1min. | | | | | | | 1min. | 1min. | | 30min. | | | | | 100% / 8,0 | • | • | • | • | • |

| Produkt | Klassifizierung | Desinfektionswirkstoff | | | Anwendungsgebiete | | | | | Eigenschaften | | | | | Wirkungsbereiche | | | | | | | | | | | | | | | Einsatzbereiche | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Medizinprodukt | Aldehyde | QAV | Amine | Instrumentendesinfektion | Instrumentenreinigung | Entkalken, Klarspülen und Reinigen | für Metall, Glas, Keramik | für flexible Endoskope | farbstofffrei | parfümfrei | aldehydfrei | entschäumend | Listung | *Bacteria + C. albicans* VAH oder EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562 | | | TbB (*M. terrae*) VAH oder EN 14348, EN 14563 | | | | Viren | | | | | | | fungizid | Gesundheitswesen | Food & Gastro | Gebäudereinigung | Industrie | Kommunen |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5min. | 15min. | 60min. | 5min. | 15min. | 30min. | 60min. | behüllte Viren “begrenzt viruzid” | begrenzt viruzid PLUS inkl. Rota | viruzid (EN 14476) | Adeno | Noro | Polio | Polyoma SV 40 | A. brasiliensis | | | | | |
| HeptaPURE KONZ | IIb | | • | • | • | • | | • | • | • | | • | | VAH/IHO | | 2% | 1,0% | | 2,0% | | 1,0% | 2% 15min. 1% 60 min. | 3,0% 15min. | 5,0% 60min. | 3,0% 15min. | 3,0% 15min. | 5,0% 60min. | 5,0% 60min. | 5% 60min. | • | | | • | |
| DecaPURE KONZ | IIb | • | | | • | | | • | • | • | | | | VAH/IHO | 3,0% | 1,5% | 1,0% | 4,0% | 3,0% | | 1,5% | 0,5% 5min. | 1,5% 15min. | 3% 15min. 1,5% 60min | 1,5% 15min. | 1,5% 15min. | 3% 15min. 1,5% 60min. | | | • | | | | |
| PentaPURE KONZ | I | | | | | | • | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | |

# PentraMAN

- **Händedesinfektion PentraMAN 10g/57,6g pro 100g Flüssigkeit zur Anwendung auf der Haut**
- **1-Propanol/Ethanol 96%**

## Was ist Händedesinfektion PentraMAN und wofür wird es angewendet?

Händedesinfektion PentraMAN ist ein Desinfiziens/Antiseptikum und wird angewendet zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.

## Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. Mycobakterien), fungizid, viruzid
- Händedesinfektion PentraMAN darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen 1-Propanol, Ethanol oder einen der sonstigen Bestandteile sind.
- Nicht auf Schleimhäuten und offenen Wunden anwenden.

## Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Verursacht schwere Augenreizung. Händedesinfektion PentraMAN ist alkoholhaltig und brennbar. Vor Anwendung elektrischer Geräte die mit Händedesinfektion PentraMAN eingeriebene Haut gut trocknen lassen. Nicht verschlucken oder in den Blutkreislauf gelangen lassen. Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen. Wollwachs und Lanolinpoly(oxyethylen)-75 können örtlich begrenzte Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) auslösen.

## Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt

## Schwangerschaft und Stillzeit

Bei sachgemäßem Gebrauch kann Händedesinfektion PentraMAN während der Schwangerschaft und der Stillzeit angewendet werden.

## Wie ist Händedesinfektion PentraMAN anzuwenden?

Zur hygienischen Händedesinfektion unverdünnt in die Hände einreiben, diese während 30 Sekunden feucht halten. Zur chirurgischen Händedesinfektion unverdünnt die Hände und Unterarme einreiben, diese während 1,5 Minuten feucht halten. Zur Virusinaktivierung unverdünnt in die Hände einreiben, diese während 1 Minute feucht halten.

## Art der Anwendung

Zur Anwendung auf der intakten Haut. Händedesinfektion PentraMAN ist zur äußerlichen Anwendung auf der intakten Haut, jedoch nicht auf Schleimhäuten und Wunden bestimmt. Die Lösung ist nicht zur Einnahme oder intravenösen Applikation geeignet.

## Anwendungsfehler und Überdosierung

Nach bestimmungswidriger oraler Aufnahme größerer Mengen von Händedesinfektion PentraMAN (ab ca. 0,5ml/kg ) ist mit Intoxikationserscheinungen durch die enthaltenen Alkohole zu rechnen. Bei qualitativ ähnlichen Wirkungen ist Propanol ca. 1,5- bis 2-mal toxischer als Ethanol. Das klinische Bild einer kombinierten Intoxikation dürfte dem der in Fachkreisen bekannten reinen Ethanolintoxikation entsprechen. Die Notfallbehandlung hat zunächst den allgemeinen Prinzipien der Vergiftungsbehandlung (z. B. möglichst vollständige primäre Giftelimination und Verhinderung weiterer Resorption) zu folgen. Neben symptomatischen Maßnahmen ist (im Unterschied zur kombinierten Methanol/Ethanol Intoxikation) vordringlich eine rasche Senkung des Ethanol-Blutspiegels (z. B. mittels Glucose- oder Lävulose-Infusionen, ggf. Dialyse) anzustreben, da hohe Ethanolspiegel den enzymatischen Abbau des Propanols verzögern.

## Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Insbesondere bei mehrfacher Anwendung kann es zu Irritationserscheinungen der Haut (z. B. Austrocknung, Schuppung, Rötung, Spannung, Juckreiz) und bei hochfrequenter Anwendung auch zu weitergehenden Hautreizungen mit oberflächlichen Defekten kommen. Das Ausmaß und der Schweregrad dieser Erscheinungen hängen direkt mit der Häufigkeit der Anwendung und der Durchführung angemessener Hautpflegemaßnahmen zusammen. Bei dem ersten Auftreten von Irritationserscheinungen sind die Hautpflegemaßnahmen zu intensivieren.

## Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## Wie ist Händedesinfektion PentraMAN aufzubewahren?

- Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
- Alkoholhaltig, brennbar.
- Bei extremer Erwärmung Explosionsgefahr.
- Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.
- Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate.
- Eindringen größerer Mengen der Flüssigkeit in Kanalisation verhindern.
- Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen.
- Vor Anwendung elektrischer Geräte gut trocknen lassen.
- Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder in das WC leeren, sondern Problemstoffsammelstelle oder Sonderabfallsammler übergeben.
  Sonderabfall Schlüsselnr. 070104, AVV.

# PFLICHTTEXTANGABEN

Stand der Information: November 2017

## Inhalt der Packung und weitere Informationen

**Wirkstoffe:**
100g enthalten 10g 1-Propanol und 57,6g Ethanol 96%.

**Sonstige Bestandteile:**
Gereinigtes Wasser, Propylenglycol, Butan-1,3-diol, Glycerol, 2-Butanon, Phosphorsäure 85%, Lanolin-poly(oxyethylen)-75, Parfum Fresh.

Pharmazeutischer Unternehmer / Hersteller: PRISMAN GmbH, Otto-Hahn-Ring 6-18, 64653 Lorsch, Tel.: 06251 866980-0

Zul.-Nr.: 86108.00.00

# TetraMAN

- **Händedesinfektion 2-Propanol 70% (V/V) Lösung**
- **Gemäß Standardzulassung (§510/11 AMG)**

## Art der Anwendung:

Zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen.

## Stoff- oder Indikationsgruppe

Desinfektionsmittel

## Anwendungsgebiete

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; Kühlumschläge.

## Dosieranleitung und Art der Anwendung

- Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten.
- Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 5 Minuten lang feucht gehalten.
- Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten.
- Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feucht gehalten.
- Zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 10 Minuten lang feucht gehalten. Für Kühlumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.

## Gegenanzeigen

Das Händedesinfektionsmittel ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

## Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt

## Nebenwirkungen

Bei Hauteinreibungen mit der Händedesinfektion können Hautrötungen und leichtes Brennen auftreten.

## Warnhinweise

Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie die Beseitigung von Zündquellen.

## Hinweise

Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z.B. feuchte Haut, Verschmutzungen der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. Händedesinfektion wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet.

## Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 62,8 g 2-Propanol, gereinigtes Wasser.

**Hinweis: Dicht verschlossen aufbewahren.**
**Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.**
**Zur Desinfektion im Gesundheitswesen.**

Zugelassen nach AMG in Deutschland. Zul.-Nr. 1599.98.99.

Pharmazeutischer Unternehmer / Hersteller: PRISMAN GmbH, Otto-Hahn-Ring 6-18, 64653 Lorsch, Tel.: 06251 866980-0

# WAS BEDEUTET EIGENTLICH...

## ARZNEIMITTEL

Arzneimittel dienen zur Heilung oder Verhütung menschlicher oder tierischer Krankheiten. Bei den Desinfektionsmitteln gilt die chirurgische Händedesinfektion in Deutschland noch als Arzneimittel. Eine Ausnahmeregelung wurde EU-weit für die chirurgische Händedesinfektion auf Isopropanol-Basis geschaffen: Diese darf auch als Biozid ausgelobt werden. Bei den PuraDES Händedesinfektionen sind sowohl Arzneimittel als auch Biozide vorhanden.

## BIOZID

Biozid-Produkte sind Mittel zur Bekämpfung von unterschiedlichen Organismen und daher potenziell für Mensch und Umwelt nicht ungefährlich. Daher dürfen nur behördlich geprüfte Produkte (wie z.B. die Produkte aus der PuraDES-Serie) eingesetzt werden. Die Zulassung und Inverkehrbringung ist in Europa durch die Biozid-Verordnung (EU) Nr. 528/2012 geregelt. Biozide und Medizinprodukte können auch doppelt ausgelobt werden (sog. „Dual Use“).

## MEDIZINPRODUKT

Ein Medizinprodukt dient zu medizinisch, therapeutischen oder diagnostischen Zwecken für den Menschen. Medizinprodukte müssen vor dem Verkauf zugelassen werden. Die Zulassung ist z.B. durch die Aufbringung des CE-Kennzeichens erkennbar und in Deutschland und Österreich geregelt über das Medizinproduktegesetz (MPG) und zukünftig zusätzlich über die EU-weit geltende Medizinprodukteverordnung. Die PuraDES Instrumentendesinfektion und Flächendesinfektionen zählen zu Medizinprodukten.

MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC™ C021366

**Exklusiv erhältlich bei IGEFA** – Igefa Handelsgesellschaft mbH & Co. KG,
Henry-Kruse-Str. 1, 16356 Ahrensfelde OT Blumberg, info@igefa.de, www.igefa.de

www.purades.de
info@purades.de

Rev. 02