







Desinfektionsplan NORO für Kindergärten und Schulen



Noroviren sind bereits ab 2 Erkrankungen meldepflichtig gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 Infektionsschutzgesetz.
Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflicht gem. § 34 Infektionsschutzgesetz.

Die Eltern aller Kinder sollten über die aufgetretene Durchfallerkrankung informiert werden.
Das erkrankte Kind ist bis zur Abholung durch die Eltern möglichst getrennt von den übrigen Kindern zu betreuen.
Die Person, die das erkrankte Kind betreut, sollte nicht in die Essenzubereitung und -verteilung eingebunden werden.
Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und an einer infektiösen Gastroenteritis erkrankt sind, dürfen eine Gemeinschaftseinrichtung nicht besuchen.

Was?	Wann?	Womit?			Wie?
Maßnahmen	Häufigkeit	Präparat / Produkt	Konz.	EWZ	Häufigkeit
 Hygienische Händedesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> Nach jedem Wickeln Nach Kontakt mit Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem Bei erhöhter Infektionsgefahr mehrmals täglich Bei Bedarf 	TetraMAN B	gebrauchsfertig	30 Sek.	Ausreichende Menge gründlich in die trockenen Hände einreiben. Besondere Berücksichtigung von Hauptkontaktstellen, Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalz. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konz. Präparat feucht gehalten werden.
 Händereinigung	<ul style="list-style-type: none"> Bei Arbeitsbeginn und -ende Nach Toilettenbenutzung Bei optischer Verschmutzung Bei Bedarf 	TetraMAN SOAP	_____	_____	Hände mit Wasser anfeuchten, Produkt entnehmen und aufschäumen. Anschließend Hände gründlich abspülen und mit Einmalhandtuch trocknen.
 Fieberthermometer	Sofort nach Gebrauch	DecaBAC S DecaWIPES (alkoholisch)	gebrauchsfertig	1 Min.	Mit desinfektionsmittelgetränktem Einmaltuch vollständig abwischen.
 Spielzeug	Nach Verschmutzung mit (potentiell) infektiösem Material (z. B. Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem)	DecaBAC S DecaWIPES (alkoholisch)	gebrauchsfertig	1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen. Vor Wiederbenutzung mit Trinkwasser abspülen.
 Wickeltischauflage	Nach Gebrauch	DecaBAC S DecaWIPES (alkoholisch)	gebrauchsfertig	1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.
 Alle Kontaktflächen: Arbeitsflächen, Inventar, Wickeltisch	Täglich: Nach Verschmutzung mit (potentiell) infektiösem Material (z. B. Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem)	DecaBAC S DecaWIPES (alkoholisch)	gebrauchsfertig	1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.

 Fußböden	Täglich: Nach Verschmutzung mit (potentiell) infektiösem Material (z. B. Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem)	PentaCID KONZ	1,5 %	15 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.
 Toilette, Waschbecken	Täglich: Nach Verschmutzung mit (potentiell) infektiösem Material (z. B. Blut, Ausscheidungen, Erbrochenem)	PentaCID KONZ	1,5 %	15 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.

Alle Präparate zur Flächendesinfektion können im PuraDES drywipes Spendersystem eingesetzt werden.

Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten. Desinfektionslösungen sind immer mit kaltem Wasser anzusetzen. Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht für die Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind Schutzhandschuhe zu tragen. Bei behördlich angeordneten Entseuchungen aufgrund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste d. Robert Koch Institutes (§18 IfSG) anzuwenden. Die Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

www.purades.de · info@purades.de