

# Desinfektionsplan für Gastronomie



Was?	Wann?	Womit?			Wie?
Maßnahmen	Häufigkeit	Präparat / Produkt	Konz.	EWZ	Häufigkeit
 <b>Hygienische Händedesinfektion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor dem Anziehen/nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen</li> <li>• Vor dem Umgang mit Lebensmitteln bzw. Nahrungsaufnahme</li> <li>• Vor der Zubereitung von Essen</li> <li>• Vor der Essensausgabe</li> <li>• Nach Umgang mit kritischen Lebensmitteln wie Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei</li> <li>• Vor Dienstbeginn, nach Pausen,</li> <li>• Toilettenbesuch bzw. Dienstende</li> <li>• Nach Niesen/Husten/Naseputzen</li> <li>• Nach Beendigung von Reinigungsoder Schmutzarbeiten</li> </ul>	<b>TetraMAN B</b>	gebrauchsfertig	30 Sek.	Präparat in die hohlen, trockenen Hände geben und gemäß Standard-Einreibemethode (EN 1500) über die gesamte Einwirkzeit hinweg bis zu den Handgelenken kräftig einreiben. Hände über die gesamte Einwirkzeit feucht halten. Bei groben Verschmutzungen vorab entfernen.
 <b>Händereinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Arbeitsbeginn und -ende</li> <li>• Nach Toilettenbenutzung</li> <li>• Bei optischer Verschmutzung</li> <li>• Nach Kontakt mit Fetten oder Ölen</li> </ul>	<b>TetraMAN SOAP</b>	_____	_____	Hände mit Wasser anfeuchten, Produkt entnehmen und aufschäumen. Anschließend Hände gründlich abspülen und mit Einmalhandtuch trocknen.
 <b>Händepflege</b>	Nach einer die Haut belastenden Tätigkeit. Insbesondere vor Arbeitsbeginn, in Pausen und nach Arbeitsende	_____	_____	_____	Creme oder Lotion auf den Handrücken geben, von dort gleichmäßig in beide Hände einmassieren. Pflegefilm einziehen lassen. Fingerzwischenräume und Nagelbetten beachten.
 <b>Spezieller Hautschutz</b>	Vor einer die Haut belastenden Tätigkeit Hautschutzprodukte sind kein Ersatz für Schutzhandschuhe!	_____	_____	_____	Produkt aus Spender oder Tube entnehmen und gründlich in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Dabei mit dem Handrücken beginnen und besonders auf Fingerzwischenräume und Nagelbetten achten.
 <b>Aufbereitung von Dosier- und Spenderpumpen</b>	Bei jedem Flaschenwechsel	<b>Warmes Wasser</b>	_____	_____	Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem Einmaltuch abwischen und durchspülen.
 <b>Aufbereitung des Spendergehäuses</b>	Bei jedem Flaschenwechsel	<b>DecaBac S DecaWipes (alkoholisch)</b>	gebrauchsfertig	1 Min.	Mit einem mit Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen.

**Auf spannungslosen Zustand der Geräte achten**

	Arbeitsflächen, Theken, Tablett, Transportwagen, Gehäuse elektrischer Geräte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nach Umgang mit kritischen Lebensmitteln (Fleisch, Geflügel, Fisch, Ei)</li> <li>1 x täglich</li> </ul>	TetraCID KONZ	0,5 %	30 Min.	Oberfläche gründlich benetzen, einwirken lassen.
	Aufschnittmaschine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Bedarf</li> <li>1 x täglich</li> </ul>				
	Schneidebretter, Lebensmittelbehälter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nach Umgang mit kritischen Lebensmitteln (Fleisch, Geflügel, Fisch, Ei)</li> <li>1 x täglich</li> </ul>	DecaBAC S	gebrauchsfertig	1 Min.	
	Mikrowelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Bedarf</li> <li>1 x wöchentlich</li> </ul>	TetraCID KONZ	0,5 %	30 Min.	Oberfläche gründlich benetzen, einwirken lassen.
	Schränke, Schubladen, Griffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Bedarf</li> <li>1 x wöchentlich</li> </ul>	TetraCID KONZ	0,5 %	30 Min.	Oberfläche gründlich benetzen, einwirken lassen.
			DecaBAC S	gebrauchsfertig	1 Min.	
	Türgriffe, Handläufe, Lichtschalter	1 x täglich	DecaBAC S	gebrauchsfertig	1 Min.	Oberfläche gründlich benetzen, einwirken lassen.
	Wasch- und Spülbecken, Ausgüsse, Wandfliesen	1x täglich	TetraCID KONZ	0,5 %	30 Min.	Oberfläche gründlich benetzen, einwirken lassen.
	Dunstabzugshaube und Filter	Bei Bedarf	_____	_____	_____	Nach Herstellerangaben reinigen.
	Abfallbehälter	Nach jeder Entleerung	TetraCID KONZ	0,5 %	30 Min.	Oberfläche gründlich benetzen, einwirken lassen.
	Lagerräume, Kühlschränke, Kühlthecke	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Bedarf</li> <li>1 x wöchentlich</li> </ul>	TetraCID KONZ	0,5 %	30 Min.	Oberfläche gründlich benetzen, einwirken lassen.
	Toiletten und sanitäre Einrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Bedarf</li> <li>1 x täglich</li> </ul>	DecaBAC S	gebrauchsfertig	1 Min.	Oberfläche gründlich benetzen, einwirken lassen.
	Fußböden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Bedarf</li> <li>1 x täglich</li> </ul>	TetraCID KONZ	0,5 %	30 Min.	Oberfläche gründlich benetzen, einwirken lassen.