Desinfektionsplan für Alten- und Pflegeheime/Sozialstationen

PuraDES

Was?	Wann?	Womit?			Wie?
Maßnahmen	Häufigkeit	Präparat / Produkt	Konz.	EWZ	Häufigkeit
Hygienische Händedesinfektion	Nach pflegerischen und vor therapeutischen Maßnahmen. Bei tatsächlicher wie fraglicher Kontamitnation der Hände mit erregerhaltigen Materialien. Auch bei Benutzung von Handschuhen!	**TetraMAN PentraMAN**	gebrauchsfertig	30 Sek.	Präparat in die hohlen, trockenen Hände geben und gemäß Standard-Einreibemethode (EN 1500) über die gesamte Einwirkzeit hinweg bis zu den Handgelenken kräftig einreiben. Hände über die gesamte Einwirkzeit feucht halten.
Spezieller Hautschutz	Vor einer die Haut belastenden Tätigkeit Hautschutzprodukte sind kein Ersatz für Schutzhandschuhe!	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	Produkt aus Spender oder Tube entnehmen und gründlich in die sauberen, trockenen Hände einreiben. Dabei mit dem Handrücken beginnen und besonders auf Fingerzwischenräume und Nagelbetten achten.
Händereinigung	• Nach Toilettenbesuch, Naseputzen • Bei Verschmutzung	**TetraMAN SOAP**	_____ _____ _____	_____ _____ _____	Hände mit Wasser anfeuchten, Produkt entnehmen und aufschäumen. Anschließend Hände gründlich abspülen und mit Einmalhandtuch trocknen.
Händepflege	Nach einer die Haut belastenden Tätigkeit. Insbesondere vor Arbeitsbeginn, in Pausen und nach Arbeitsende.	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	Creme oder Lotion auf den Handrücken geben, von dort gleichmäßig in beide Hände einmassieren. Pflegefilm einziehen lassen. Fingerzwischenräume und Nagelbetten beachten.
Aufbereitung von Dosier- und Spenderpumpen	Bei jedem Flaschenwechsel	**Warmes Wasser**	_____ _____ _____	_____ _____ _____	Zum Entfernen von Produktresten mit angefeuchtetem Einmaltuch abwischen und durchspülen.
Aufbereitung des Spendergehäuses	Bei jedem Flaschenwechsel	**DecaBac S DecaWipes (alkoholisch)**	gebrauchsfertig	1 Min.	Mit einem mit Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen.
Hautantiseptik	• Vor Blutentnahmen, Punktionen und Injektionen an talgdrüsenarmer Haut • Vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen und Hohlorganen an talgdrüsenarmer Haut	**TetraMAN**	gebrauchsfertig	mind. 1 Min.	Hautareal satt benetzen und über die gesamte Einwirkzeit hinweg feucht halten.
	Vor allen Eingriffen an talgdrüsenreicher Haut	**TetraMAN**	gebrauchsfertig	10 Min.	
Körperpflege	Nach Anordnung des Arztes	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	Bewohnerkörperpflege
Körperreinigung	Bei Bedarf	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	Waschlotion dem Bade- bzw. Waschwasser zugeben. Bewohner nach dem allgemeinen Pflegestandard waschen. Nach der Waschung Haut mit klarem Wasser abspülen.
antimikrobiell bei MRSA, ORSA, VRE etc.		**TetraMAN WASH**	gebrauchsfertig	30 Sek.	
Unterstützung der Dekubitusprophylaxe und	Täglich und bei Bedarf	_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	Betreffende Körperpartien, besonders bei immobilen Bewohnern, einreiben oder einmassieren. Mittel zieht vollständig ein, ohne Fett zu hinterlassen.
Pneumonie-prophylaxe		_____ _____ _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	Rücken im Bereich der Lunge einreiben oder einmassieren.
Instrumente inkl. Schläuche	Unmittelbar nach Gebrauch	**HeptaPURE Konz.**	2,0 %	15 Min.	Reinigen und Desinfizieren, abspülen, trocknen, kontrollieren, verpacken, sterilisieren. Lösung mind. 1 x täglich erneuern.
Blutdruckmanschetten / Stethoskope		**DecaBac S DecaWipes (alkoholisch)**	gebrauchsfertig	1 Min.	Mit einem mit Desinfektionsmittel befeuchtetem Einmaltuch die Flächen abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen. Unzugängliche Flächen einsprühen.
Fieberthermometer	• Nach Benutzung • Bei Bewohnerwechsel	**DecaBac S DecaWipes (alkoholisch)**	gebrauchsfertig	1 Min.	Mit einem mit Desinfektionsmittel befeuchteten Einmaltuch die Flächen abwischen. Vollständig benetzen, nicht nachwischen.
Arbeitsflächen Verbandwagen	1 x wöchentlich und nach Kontamination	**PentaCID Konz. Konz.**	0,5 %	15 Min.	Nach der Feucht-Wisch-Methode desinfizierend reinigen. Nicht nachtrocknen.
	Tägliche Unterhaltsreinigung				Feucht abwischen
Bett Matratze Nachttische	• Nach Kontamination • Nach jedem Bewohnerwechsel	**PentaCID Konz. Konz.**	0,5 %	15 Min.	Nach der Feucht-Wisch-Methode desinfizierend reinigen. Nicht nachtrocknen.
	Tägliche Unterhaltsreinigung				Feucht abwischen.
Fläche allgemein	• Nach Kontamination • Nach jedem Bewohnerwechsel	**PentaCID Konz.**	0,5 %	15 Min.	Nach der Feucht-Wisch-Methode desinfizierend reinigen. Desinfektion und Reinigung nur mit ordnungsgemäß aufbereiteten Putzutensilien durchführen.
	Tägliche Unterhaltsreinigung				
Küche, Stationskühlschränke, Inventar, Fläche	• Nach Abtauen • Bei Bedarf	**PentaCID Konz.**	0,5 %	15 Min.	Der Kühlschrank ist innen von oben nach unten desinfizierend zu reinigen. Gleichmäßig benetzen. Nach EWZ mit Trinkwasser nachwischen.
Waschschüsseln Nierenschalen	Nach jeder Benutzung	**PentaCID Konz.**	0,5 %	15 Min.	Mit Desinfektionslösung gründlich von außen und innen wischen. Nach EWZ abspülen und trocknen.
Badewannen Waschbecken Hubbadewanne	Nach jeder Benutzung	**PentaCID Konz.**	0,5 %	15 Min.	Desinfizierend reinigen. Gut nachspülen.
Toiletten Abfalleimer	• Täglich • Nach Kontamination	**PentaCID Konz.**	0,5 %	15 Min.	Desinfizierend reinigen. Gleichmäßig benetzen. Ordnungsgemäß zubereitete Lösung verwenden. Nicht nachtrocknen.
Steckbecken Urinflaschen	Nach Gebrauch	**Manuelle Aufb. PentaCID Konz.**	**0,5 %**	**15 Min.**	Oberflächen mit Desinfektionsmittel getränktem Tuch abwischen. Nach EWZ abspülen und trocknen. Nach dem Entleeren werden die Materialien im Automat platziert und der Spülgang wird gestartet.
		Maschinelle Aufb. PentaPURE Konz.	_____ _____	_____ _____	

www.purades.de · info@purades.de

Rev. 09/2020